

Bestimmungshilfe für den Sperber (*Accipiter nisus*)

Liebe Bürger*innen der Stadt Köln,

wir möchten Sie mit dieser Anleitung bei der Kartierung des Sperbers unterstützen und Ihnen hiermit die wichtigsten Bestimmungsmerkmale aufzeigen. Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, einen schnellen Überblick über die Besonderheiten des Sperbers zu erhalten und die Tiere in ihrer Umgebung von anderen Greifvögeln zu unterscheiden.

Vielen Dank für Ihre Hilfe!



Das Brustgefieder beim Männchen ist **weiß mit rostroter Querbänderung** und rostroten Flanken.



Das **Brustgefieder** beim Weibchen ist **weiß mit dunkler Querbänderung**.



Der Sperber erreicht eine **Größe von 30 bis 38 cm**. **Weibchen (l.)** sind **größer** als die **Männchen (r.)**.

Die **Flug-Silhouette** des Sperbers zeigt deutlich seinen **langen Schwanz** und seine **kurzen Flügel**.



Der Sperber besitzt **Füße**. Der **Schwanz** des Sperbers ist **lang, gerade** und besitzt **4 bis 5 dunkel Querbänder**.

Die **Flügel** des Sperbers sind **kurz** und **breit**. Die Flügelspitzen sind abgerundet und leicht gefingert.



Der **schmale, gelbe Umring am Augenlid** (Gelber Augenring) ist ein wichtiges Bestimmungsmerkmal des Sperbers.

Das **Rückengefieder** kann von **blaugrau** bis **graubraun** gefärbt sein.

